

Ficha Técnica TRIMAX

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: INSETICIDA TRIMAX
Nome Comum: Bifentrina, Piriproxifem e Acetamiprido.
Categoria: Inseticida Líquido
Registro Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0065
Composição química:

Bifentrina: (2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate.
Piriproxifem: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether.
Acetamiprido: (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine.

COMPOSIÇÃO:

BIFENTRINA10,0% (p/v)
PIRIPROXIFEM.....10,0% (p/v)
ACETAMIPRIDO.....10,0% (p/v)
Inertes (umectante, dispersante, antiespumante, bactericida, agente estruturante e veículo)70,0% (p/v)

INDICAÇÕES DE USO:

TRIMAX é um produto elaborado com BIFENTRINA, ACETAMIPRIDO e PIRIPROXIFEM, eficaz contra escorpião (*Tytus serrulatus*), barata (*Blattella germanica*), mosquitos e suas larvas (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), carrapato (*Amblyomma cajennense*), mosca (*Musca domestica*), percevejo (*Cimex sp*) e pulga (*Ctenocephalides felis*).

INSTRUÇÕES DE USO:

Controle de moscas, mosquitos e larvas de mosquitos: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m², onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem. No controle de moscas, aplicar uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos, -os e superfícies onde as moscas pousam.

No controle de baratas e pulgas: diluir 20 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar em frestas, cantos, pisos, rachaduras e barreira protetora em áreas externas.

Carrapato-estrela: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m². Usar o volume de calda necessário para uma melhor cobertura na vegetação (gramados, arbustos e jardins). Esta recomendação é válida somente para o uso nos carrapatos na fase de vida no ambiente. Reaplicações são recomendadas quando for constatada a reinfestação dos ambientes.

Percevejo da cama: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m², aplicar em frestas e fendas.

No controle de escorpião: diluir 40 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar uniformemente formando uma barreira protetora no piso e parede ao redor das edificações, aplicar também em pilhas de tijolos, madeira e entulhos, etc.

PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

-Não fumar ou comer durante a aplicação.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.

-Após aplicação, abrir portas e janelas para aeração do local tratado, diminuindo a incidência dos resíduos do ativo no ambiente.

PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. -Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Em caso de pequenos derramamentos, utilize um pano ou estopa para absorver o produto, fazendo uso de uma luva para se proteger. Em caso de grandes derramamentos, isole e sinalize a área contaminada, não deixe o produto escorrer para ralos, bueiros ou mananciais. Absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a Insetimax para indicação da destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplex lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Proceda a inutilização da embalagem furando o fundo da mesma e proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia ou acesse o site da ABAS: www.as.org.br/embalagem.htm.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original, em local seco, ventilado, temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe das fontes de calor.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan
CRQ: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretróide, Éter Piridiloxipropílico e Neonicotinóide.

Nome Comum: Bifentrina, Piriproxifem e Acetamiprido.

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico e Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018